




PRAXIS  
DR. MED. Y. BIENWALD

Spezialärztin für  
Gynäkologie und Geburtshilfe  
FMH



PRAXIS  
DR. MED. Y. BIENWALD

Spezialärztin für  
Gynäkologie und Geburtshilfe  
FMH



## 1&11 Lotion OMIDA Schüssler

So genannte **Schwangerschaftsstreifen (Striae gravidarum)**, treten während einer Schwangerschaft vor allem an Brust, Bauch, Hüfte und Gesäß auf. Die Betroffenen sind keine Einzelfälle, denn die bläulich-rötlichen Dehnungstreifen betreffen 50 % bis 80 % aller Schwangeren.

Für die Entstehung ist neben empfindlicher und heller Haut, das Hormon Kortisol und die starke Überdehnung des Hautbindegewebes durch rasche Gewichtszunahme verantwortlich. Dabei kommt es zu irreparablen Rissen elastischer Fasern, die äußerlich zu sichtbaren bläulich-roten Streifen führen. Um dem Auftreten von Striae frühzeitig entgegenzuwirken, sowie zur Behandlung bereits bestehender Dehnungstreifen, sollte

1&11 Lotion OMIDA Schüssler 1x täglich dünn auf die gefährdeten Hautstellen (Bauch, Brüste, Hüften, Oberschenkel) aufgetragen und dann sanft und vollständig einmassiert werden. Schwangere können 1&11 Lotion OMIDA Schüssler ab der 13. Schwangerschaftswoche anwenden.

**1&11 Lotion OMIDA Schüssler à 500 ml kann bei uns in der Praxis bezogen werden zum Preis von Fr. 39.90.**

## 1&11 Lotion OMIDA Schüssler

So genannte **Schwangerschaftsstreifen (Striae gravidarum)**, treten während einer Schwangerschaft vor allem an Brust, Bauch, Hüfte und Gesäß auf. Die Betroffenen sind keine Einzelfälle, denn die bläulich-rötlichen Dehnungstreifen betreffen 50 % bis 80 % aller Schwangeren.

Für die Entstehung ist neben empfindlicher und heller Haut, das Hormon Kortisol und die starke Überdehnung des Hautbindegewebes durch rasche Gewichtszunahme verantwortlich. Dabei kommt es zu irreparablen Rissen elastischer Fasern, die äußerlich zu sichtbaren bläulich-roten Streifen führen. Um dem Auftreten von Striae frühzeitig entgegenzuwirken, sowie zur Behandlung bereits bestehender Dehnungstreifen, sollte

1&11 Lotion OMIDA Schüssler 1x täglich dünn auf die gefährdeten Hautstellen (Bauch, Brüste, Hüften, Oberschenkel) aufgetragen und dann sanft und vollständig einmassiert werden. Schwangere können 1&11 Lotion OMIDA ab der 13. Schwangerschaftswoche anwenden.



PRAXIS  
DR. MED. Y. BIENWALD

Spezialärztin für  
Gynäkologie und Geburtshilfe  
FMH



PRAXIS  
DR. MED. Y. BIENWALD

Spezialärztin für  
Gynäkologie und Geburtshilfe  
FMH



**1&11 Lotion OMIDA Schüssler à 500 ml kann bei uns in der  
Praxis bezogen werden zum Preis von Fr. 39.90.**